

## **CUIDADOS TRAS LA CIRUGÍA PERIODONTAL**

1. Aplicar hielo de forma intermitente en la zona de la intervención durante al menos dos horas.
2. No hacer enjuagues durante el primer día.
3. No tomar comidas calientes durante el primer día.
4. No fumar.
5. Tomar la medicación siguiendo las pautas explicadas por el doctor el día de la intervención.
6. Durante el primer día la saliva estará manchada de sangre. En caso de hemorragia moderada/severa, aplicar presión con una gasa durante 20-30 minutos. Repetir el procedimiento si el sangrado no cesa. Llamar a la clínica si no logra controlar la hemorragia.
7. Cepillar la zona tratada en cuanto disminuyan las molestias.
8. La sensibilidad y el aumento de la movilidad en los dientes tratados son efectos secundarios normales en este tipo de tratamiento, principalmente durante las dos primeras semanas.
9. En caso de aumento de dolor a los 3-4 días, podría ser necesario un antibiótico (o cambiar el que se esté utilizando). En ese caso ponerse en contacto con la clínica.
10. No dude en consultarnos si tiene alguna duda. Puede hacerlo en cualquier momento y hora desde nuestra pagina web ([www.clinicabarbieri.com](http://www.clinicabarbieri.com)), en el apartado “área del paciente”. Dentro del “área privada” tiene la posibilidad de hacerle preguntas al doctor o al personal de la clínica.