

CUIDADOS TRAS CIRUGÍA DE INJERTO GINGIVAL

1. Aplicar hielo de forma intermitente en la zona de la intervención durante al menos dos horas. Es importante no aplicar presión.
2. No hacer enjuagues durante las tres primeras semanas.
3. No tomar comidas calientes durante el primer día.
4. No fumar o reducir el consumo de tabaco al máximo durante las dos primeras semanas.
5. Tomar la medicación siguiendo las pautas explicadas por el doctor el día de la intervención.
6. Durante el primer día la saliva estará manchada de sangre. En caso de hemorragia moderada/severa procedente del paladar, aplicar presión con una gasa durante 20-30 minutos. Repetir el procedimiento si el sangrado no cesa. Llamar a la clínica si no logra controlar la hemorragia. Si la hemorragia procede de la zona del injerto, la presión debe realizarse extraoralmente.
7. No cepillar la zona del injerto durante los dos primeros meses. A partir de este momento el cepillado debe ser muy suave y en dirección encía → diente.
8. En caso de aumento de dolor a los 3-4 días, podría ser necesario un antibiótico (o cambiar el que se esté utilizando). En ese caso ponerse en contacto con la clínica.
9. No dude en consultarnos si tiene alguna duda. Puede hacerlo en cualquier momento y hora desde nuestra pagina web (www.clinicabarbieri.com), en el apartado “área del paciente”. Dentro del “área privada” tiene la posibilidad de hacerle preguntas al doctor o al personal de la clínica.